

SALVACOLON

Suspensión Estemporánea
Vía oral

REGENERADOR DE LA FLORA INTESTINAL

FORMULA:	Por 120 ml	Fórmula para 5 ml
B. subtilis	20 mg*	0,83 mg
Vitamina B ₁	48 mg	2 mg
Vitamina B ₂	12 mg	0,5 mg
Vitamina B ₆	120 mg	5 mg
Vitamina B ₁₂	144 mcg	6 mcg
Vitamina PP.....	480 mg	20 mg
Pantotenato de calcio (D.C.I.)	240 mg	10 mg
L-Lisina clorhidrato.....	7.200 mg	300 mg
Factor intrínseco	720 mg	30 mg
Excipientes: Sacarina sódica	59,8 mg	2,5 mg
Sacarosa	6.080 mg	253 mg
Aroma de naranja, Sílice coloidal		
* 2.000 millones de esporas		

INDICACIONES

Diarreas, enteritis, enterocolitis, eubiótico intestinal, estreñimiento, anorexia, halitosis, aftas bucales. Se aconseja durante y después de los tratamientos con antibióticos y sulfamidas.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Este medicamento contiene 253 mg de sacarosa por cada 5 ml de suspensión, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTERACCIONES

Con ácido p-aminosalicílico, colchicina, neomicina.

POSOLOGIA

En tratamientos prolongados, 10-30 ml de la suspensión efectuada dos veces al día, tomados entre comidas.

En los casos de tratamiento con antibióticos, el SALVACOLON debe tomarse dos horas antes o después de la correspondiente dosis de antibióticos.

En niños y lactantes dosis de 2 ml (1/2 cuchara de café) a 5 ml (1 cuchara de café) 2 veces al día.

Sobredosificación: No existe peligro de intoxicación por sobredosificación.

Normas para la correcta preparación y administración: Añadir agua potable hasta la señal de enrase. Tapar y agitar hasta conseguir la completa dispersión.

Verter el contenido del frasco así agitado en una cuchara de café; se recomienda desleirlo en agua azucarada o leche.

En los lactantes puede incorporarse a la leche del biberón, procurando que esté lo menos caliente posible.

Tiempo de validez de la suspensión y conservación: La validez de esta preparación una vez restituida la suspensión será de 15 a 20 días, siendo necesario mantenerla en el frigorífico.

REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

Deberá informar a su médico o farmacéutico de cualquier reacción adversa no descrita en el presente prospecto, que pudiera padecer durante el consumo de este medicamento.

PRESENTACION

Frasco de 120 ml.

No consumir la especialidad después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Sin receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

Sin receta médica

Director Técnico Farmacéutico: E.M.T. MUSSO

Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A.
Gall, 30-36 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA

9403