

ULTRA-LEVURA LIOFILIZADA

Composición cuantitativa

Saccharomyces boulardii 17 (cepa resistente a los antibióticos): 1.000 millones de gérmenes vivos: 56,5 mg
Excipientes: Sacarosa (92,3 mg), estearato magnésico, c.s.p. 1 cápsula.

Indicaciones

Profilaxis y tratamiento de los trastornos de la antibioterapia por destrucción de la flora intestinal. Afecciones intestinales, diarreas de fermentación y de putrefacción.
Candidiasis (bucales, muguet, esofágicas, gástricas, intestinales, ano-rectales).

Precauciones

Mantener el frasco bien cerrado. Conservar al abrigo del calor y de la humedad.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Advertencia

Este medicamento contiene 92,3 mg de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Incompatibilidades

No se han descrito.

Intoxicación y su tratamiento

No es posible la intoxicación con esta especialidad aún a dosis superiores a las terapéuticas. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 – 562 04 20.

Posología

Afecciones agudas: tratamiento de ataque 6-8 cápsulas diarias; mantenimiento 2 cápsulas/día. Candidiasis: 6 cápsulas diarias, mínimo durante 1 ó 2 meses.

Normas para la correcta administración del preparado

El medicamento debe ingerirse de preferencia por la mañana al despertarse o antes de las comidas. Eventualmente se tomará al mismo tiempo que la toma de antibióticos. Se puede mezclar con líquidos (leche sola, agua azucarada, etc.) teniendo la precaución de no mezclarlo con líquidos muy calientes o fuertemente alcohólicos. Puede tragarse la cápsula entera o bien extraer el polvo.

Presentación

Envases con 20 y 50 cápsulas. VIA ORAL.

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UPSAMEDICA, S.A.C/ Almansa, 101. 28040- MADRID.